




קצב העליה של חולים נתמכים נשימתית עלה מאד - יש לעצור את ההתדרדרות.

קצב העליה במאושפזים נתמכים נשימתית "מיישר קו" עם קצב העליה של נדבקים חדשים.
עליה זו צפויה להוביל ל מעל מ 100 נפטרים בשבועות הקרובים.
בקצב ההכפלה הנוכחי – בעוד כשבועיים נהיה בהתדרדרות שעלולה להוביל לכשל ביכולת העמידה של מערכת הבריאות **ותחייב סגר חמור**


- בתחילת הגל הנוכחי – היה ניתוק בין אוכלוסיות כאשר עיקר התחלואה עלתה בקרב "לא פגיעים".
- מגמה זו השתנתה לפני כשבועיים ומתבטאת כמזה 5 ימים בקצב הכפלה זהה לנדבקים ולמאושפזים נתמכים נשימתית.
- הסבר סביר לתופעה זו – פתיחת ארועים רבי משתתפים ב 15/6. פתיחה זו איפשרה הדבקה צולבת בין אוכלוסיית הפגיעים והלא פגיעים. הדבקה זו התבטאה תוך כ 10 ימים (החל מה 26/6) בעליה במאושפזים.
- העליה באשפוז וההתאמה בקצב העליה מבהירה שלא מדובר בשגיאת מדידה או בשינוי במאפייני המחלה ונדרשת פעולה דחופה.

- סביר שניתן לעצור את העליה בקצב ההדבקה ע"י מניעת ארועים רבי משתתפים תוך דגש על מניעת ארועים בחללים סגורים.
- עם זאת, מכיוון שחולה מאושפז נדבק כ 10 ימים לפני אשפוזו, העליה בכמות המאושפזים ב 10 ימים הקרובים בלתי נמנעת.
- ההשפעה של עצירה שכזו תזוהה רק כ 10 ימים לאחר הפעולה.



קיים חלון הזדמנויות קצר של מספר ימים, שיאפשר מניעה להגעה של מאות חולים נתמכים נשימתית.
הגעה לכ 400 חולים נתמכים בקצב הכפלה של 10 ימים תחייב סגר מנע על מנת למנוע הגעה לקריסה של מערכת הבריאות.

קיימת דחיפות לצמצום מיידי של ההדבקה – אחרת לא ניתן יהיה למנוע צורך בסגר כולל.



מספר החולים קשה + בינוני
עלה באופן מתון לאחר הגל הראשון.
זמן הכפלה הגדול מ 28 יום.

10 ימים לאחר פתיחת אולמות לארועים
רבי משתתפים (ב 15/6)
התקבלה עליה חדה בקצב ההדבקה.

עליה דומה לא התקבלה בפתיחה של מערכת החינוך