

גיוס למחקר SEAD

נשים עם דימום ויסתי מוגבר

בגילאים 40 עד 50

מוזמנות להשתתף במחקר חדשני לגבי השימוש ב SEAD
בו מוכנס התקן כדורי למשך 30 דקות עם חומר שתפקידו לצרוב את רירית הרחם.

הפעולה עצמה נעשית במסגרת בית חולים.

שלב מקדים:

חודשיים איסוף נתונים על כמות הדימום הויסיתית
חודש של שימוש בפרוגסטרון דרך הפה לצורך דיקוק רירית הרחם

ביצוע הפעולה:

יום במסגרת 'מרפאת אשפוז יום' באחד מבתי החולים המשתתפים במחקר (עדיפות לבי"ח קפלן,
רחובות)

הכנסת התקן כדורי למשך 30 דקות.

לאחר מכן המשך שכיבה על מיטת הבדיקה למשך 30 דקות נוספות
שעתיים השגחה. שחרור.

לאחר הפעולה:

מעקב על ידי שאלונים למשך שנה.

פרטים על החומר הפעיל:

סילבר ניטרט הינו חומר המשמש בשגרה לצריבת יבלות וכן לצריבת איזורים מדממים על פני צוואר הרחם. החידוש במחקר הוא שהחומר הפעיל אינו מוכנס על ידי מטוש או כלי נוקשה כפי שמתבצע באיזורי דימום אחרים, אלא מולבש על התקן כדורי (כדוגמת התקן הבלרין) ומוכנס אל תוך חלל הרחם למשך 30 דקות.


מעקב אחר כמות הדימום:

הערכת כמות הדימום נעשית על ידי מילוי 'שאלון תמונות' (ידני או באפליקציה). המדד המתקבל נקרא PBAC ומבטא את נפח איבוד הדם בזמן המחזור.

PADS	DAY							
	1	2	3	4	5	6	7	8
								
								
								
TAMPONS	DAY							
	1	2	3	4	5	6	7	8
								
								
								

ניסיון קודם:

בעבודה מקדימה שנעשתה בבולגריה בהשתתפות 14 נשים, נראתה ירידה משמעותית בכמות הדימום במהלך זמן המעקב (עד שנה).
בגרף המצורף יש השוואה של מדד הדימום לפני הטיפול (סגול כהה), ולאחר הטיפול.



כללים עיקריים בהתאמה למחקר:

נשים בגילאים 40-50

לא מתכננות הריון עתידי

נדרש שימוש באמצעי מניעה למשך תקופת המחקר – לא הורמונלי. לא התקן תוך רחמי.

מוזמנות לפנות לקבלת פרטים נוספים

ד"ר גיל פומפ

Doctor.pomp@gmail.com

טלי זיו

054-4918799